

## **RAPPELS POUR REMPLIR**

la fiche navette de prise en charge des dispositifs médicaux stérilisables pour la prévention du risque de transmission d'agents transmissibles non conventionnels (ATNC)

**Instruction 449 du 1<sup>er</sup> décembre 2011**

Cette instruction ne concerne que les actes invasifs cad les actes où le ou les DM entrent en contact avec les tissus à haute infectiosité soit par effraction, soit par contact avec une ulcération.

### **1. EVALUATION DU NIVEAU DE RISQUE LIE AU PATIENT**

#### **P0 = Patient ni suspect ni atteint**

- **Patient sans caractéristique particulière**
- **Patient présentant des facteurs de risque individuel d'EST :**
  - Antécédent de traitement par hormone de croissance extractive (avant 1988)
  - Antécédent dans la famille génétique d'un cas d'EST par mutation du gène codant PrP<sup>c</sup>
  - Antécédent d'intervention neurochirurgicale ou d'exploration cérébrale invasive avec ouverture de la dure-mère (avant 1995 en France)
  - Antécédent d'intervention neurochirurgicale ou d'exploration cérébrale invasive avec ouverture de la dure-mère à l'étranger
  - Antécédents de transfusion par produits sanguins labiles provenant d'un donneur rétrospectivement atteint de v-MCJ

#### **P1 = Patient suspect ou atteint**

- **EST suspectée si :**
  - apparition récente et évolution progressive sans rémission d'au moins un signe clinique neurologique associé à des troubles intellectuels ou psychiatriques et après élimination de toute autre cause
  - confirmation par les résultats d'un examen neuropathologique

### **2. EVALUATION DU NIVEAU DE RISQUE LIE AU TISSU**

#### **T2 = tissus à haute infectiosité**

- système nerveux central (y compris hypophyse, moelle épinière, dure-mère)
- rétine et nerf optique
- ganglions spinal et trijumeau
- Chirurgie ORL touchant la muqueuse olfactive (\*)
- Endoscopie touchant la muqueuse olfactive (\*)
- (\*) : La muqueuse nasale en contact avec les nasofibrosopes et les fibrosopes pulmonaires n'est pas concernée par l'épithélium olfactif)
- Formations lymphoïdes chez les patients transfusés par un donneur v-MCJ

#### **T1 = formations lymphoïdes (uniquement pour le v-MCJ)**

- rate
- ganglions lymphatiques
- amygdale
- appendice
- thymus
- Formations présentes dans jéjunum, iléon, colon, caecum et rectum
- Exploration bronchique avec ponction trans-bronchique

#### **T0 = autres tissus**