



# QUIZZ

## Précautions standard en « Phrase-rébus »

EOHH – AP-HM 2022



I) Vous êtes victime d'une blessure par pique, que faites-vous en premier après l'accident ?

- ☐ Vous alertez votre cadre de santé
- ☐ Vous demandez au patient / résident s'il est possible de lui faire un prélèvement pour une sérologie de contrôle
- ☐ Vous faites un lavage et une désinfection de la blessure selon la procédure de l'établissement
- ☐ Vous prévenez immédiatement le pharmacien de la non conformité du conteneur à aiguille



Réponse :

**Vous faites un lavage et une désinfection de la blessure selon la procédure de l'établissement**



2) Vous êtes victime d'une projection de liquide biologique sur le visage, que faites-vous en premier après l'accident ?

- ☐ Vous appelez en urgence le service susceptible de vous accueillir pour évaluer le risque
- ☐ Vous appelez le service de médecine du travail
- ☐ Vous appelez le CHSCT
- ☐ Vous effectuez un rinçage abondant



Réponse :

**Vous effectuez un rinçage abondant**



### 3) Vous connaissez et vous respectez les points essentiels suivants : (plusieurs réponses possibles)

- ☐ Ne pas recapuchonner les aiguilles
- ☐ Ne pas désadapter à la main les aiguilles, les lames de bistouris,....
- ☐ Utiliser le matériel de sécurité disponible
- ☐ Les conteneurs à objets piquants, coupants, tranchants restent à l'extérieur de la chambre du patient / résident



## Réponses :

- **Ne pas recapuchonner les aiguilles**
- **Ne pas désadapter à la main les aiguilles, les lames de bistouris,....**
- **Utiliser le matériel de sécurité disponible**



## RAPPEL DE LA PRÉCAUTION STANDARD

**Si contact avec du sang ou des liquides biologiques :**

- Après pique, blessure : lavage et antisepsie au niveau de la plaie
- Après projection sur muqueuse (conjonctive) : rinçage abondant





4.1. Vous massez le dos d'un patient/résident alité avec une huile de massage :

- Faites-vous un geste d'hygiène des mains avec un PHA immédiatement après le massage ?

4.2. Vous portez des gants pour la toilette urogénitale d'un patient / résident :

- Faites-vous un geste d'hygiène des mains avant de procéder à un autre soin pour le même patient/résident ?

4.3. Vous devez sortir de la chambre d'un patient/résident pour aller en lingerie prendre un complément de drap :

- Est-il nécessaire de réaliser une friction hygiénique des mains ?

4.4. Certains professionnels ont les mains lésées, ils disposent de gants sans poudre :

- Peuvent-ils utiliser un produit hydro alcoolique ?



## Réponses :

- 4.1. : **Non**
- 4.2. : **Oui**
- 4.3. : **Oui**
- 4.4. : **Oui**



## RAPPEL DE LA PRÉCAUTION STANDARD

### Lavage et/ou désinfection des mains

- Après le retrait des gants
- Entre deux patients / résidents
- Entre deux activités



5.1. Vous êtes infirmière. Vous réalisez la vidange du sac collecteur des urines, pour deux patients / résidents dans la même chambre :

- Gardez-vous la même paire de gants ?

5.2. Le médecin enlève le pansement pour vérifier une plaie, ou une incision chirurgicale de patients / résidents :

- Doit-il mettre des gants pour chaque patient/résident?

5.3. Vous venez de porter des gants pour faire un soin :

- Est-ce que vous réalisez une technique d'hygiène des mains lors du retrait des gants?



## Réponses :

- 5.1.: **Non**
- 5.2.: **Oui**
- 5.3.: **Oui**



6) Vous venez de poser un cathéter veineux périphérique ou sous cutané. Après avoir quitté la chambre, vous réalisez :

- ☐ Le retrait des gants
- ☐ Un geste d'hygiène des mains
- ☐ Vous éliminez le piquant coupant tranchant
- ☐ Vous assurez le nettoyage et la désinfection du chariot de soins



Réponse :

**Vous assurez le nettoyage et la désinfection du chariot de soins**



## 7.1. Pour réaliser un soin de bouche :

- Mettez-vous des gants ?

## 7.2. Pour intuber un patient :

- Est-il nécessaire de mettre des gants ?

## 7.3. Pour enlever les compresses souillées d'un pansement en chirurgie :

- Faut-il mettre des gants ?

## 7.4. Pour masser les jambes d'un patient / résident alité :

- Faut-il mettre des gants ?





## Réponses :

- 7.1.: **Oui**
- 7.2.: **Oui**
- 7.3.: **Oui**
- 7.4.: **Non**



## RAPPEL DE LA PRÉCAUTION STANDARD

### Port de gants

- Si risque de contact avec du sang, ou tout autre produit d'origine humaine, les muqueuses ou la peau lésée du patient/résident, notamment à l'occasion de soins à risque de piqûre (hémoculture, pose et dépose de voie veineuse, chambre implantable, prélèvement sanguin...) et lors de la manipulation de tubes de prélèvements biologiques, linges et matériels souillés...
- Lors des soins, lorsque les mains du soignant comportent des lésions.

### Les gants doivent être changés :

- Entre deux patients / résidents
- Entre deux activités



8.1. Vous êtes IDE, vous devez faire une aspiration trachéo-bronchique :

- Portez-vous un tablier ?

8.2. Vous réalisez des soins d'hygiène corporelle d'un patient/résident alité et dépendant :

- Mettez-vous un tablier avant de faire la toilette ?

8.3. Vous travaillez dans un service d'endoscopie :

- Portez-vous des lunettes pour effectuer le traitement des dispositifs médicaux ?

8.4. Vous êtes sage-femme :

- devez-vous porter un masque chirurgical au cours d'un accouchement ?



## Réponses :

- 8.1. : **Oui**
- 8.2. : **Oui**
- 8.3. : **Oui**
- 8.4. : **Oui**



9.1. Vous êtes aide-soignante, vous devez effectuer le prétraitement des dispositifs médicaux (D.M.) :

- Portez-vous des lunettes pendant la phase de nettoyage ?

9.2. Vous êtes kinésithérapeute :

- Portez-vous des lunettes pendant la rééducation respiratoire des patients / résidents?

9.3. Vous êtes infirmière. Pour poser un cathéter veineux périphérique ou sous cutané :

- Portez-vous un masque?



## Réponses :

- 9.1.: **Oui**
- 9.2.: **Oui**
- 9.3.: **Non**



## RAPPEL DE LA PRÉCAUTION STANDARD

### Port de surblouses, lunettes, masques

- Si les soins ou manipulations exposent à un risque de projection ou d'aérosolisation de sang, ou tout autre produit d'origine humaine (aspiration, endoscopie, actes opératoires, autopsie, manipulation de matériel, et de linges souillés...)



10.1. Vous êtes cadre de santé, vous demandez à chaque professionnel de prendre un plateau ou un chariot lors des soins :

- Doivent-ils prendre systématiquement un conteneur à aiguilles ?

10.2. Le fait d'avoir des D.M. de sécurité :

- Dispensent-ils les professionnels d'emporter le conteneur à aiguilles dans la chambre du patient / résident?

10.3. La fermeture temporaire des containers à aiguilles :

- Doit-elle être activée systématiquement après utilisation?

10.4. Le niveau de remplissage des conteneurs à aiguilles :

- Est mentionné par une graduation ?





## Réponses :

- I 0.1. : **Oui**
- I 0.2. : **Non**
- I 0.3. : **Oui**
- I 0.4. : **Non**



## MATERIEL SOUILLE

### Matériel piquant tranchant à usage unique

- Ne pas recapuchonner les aiguilles
- Ne pas les désadapter à la main
- Déposer immédiatement après usage sans manipulation ce matériel dans un conteneur adapté situé au plus près du soin et dont le niveau maximal de remplissage est vérifié

### Matériel réutilisable

- Manipuler avec précautions le matériel souillé par du sang ou tout autre produit d'origine humaine



11.1. Les différents dispositifs médicaux réutilisables sont obligatoirement désinfectés entre chaque utilisation

11.2. Les cuvettes utilisées pour la toilette et l'hygiène corporelle sont désinfectées entre chaque utilisation pour un même patient / résident

11.3. Le matériel technique revenant de réparation ou déposé en prêt (pousse seringue, appareil d'aérosolthérapie...), peut être utilisé sans désinfection



## Réponses :

- 11.1.: **Oui**
- 11.2.: **Oui**
- 11.3.: **Non**



## RAPPEL DE LA PRÉCAUTION STANDARD

### Matériel souillé

- Vérifier que le matériel a subi un procédé d'entretien (stérilisation ou désinfection) approprié avant d'être réutilisé



## I 2) Un reflux de sang a souillé le pied à sérum dans la chambre d'un patient / résident

- ☐ Vous faites seulement un essuyage rapide
- ☐ Vous effectuez les trois étapes suivantes :
  - Essuyage des salissures
  - Nettoyage de la zone
  - Désinfection de la zone concernée



Réponse :

**Vous effectuez les trois étapes suivantes :**

- **Essuyage des salissures**
- **Nettoyage de la zone**
- **Désinfection de la zone concernée**



## RAPPEL DE LA PRÉCAUTION STANDARD

### Surfaces souillées

- Nettoyer et désinfecter avec un désinfectant approprié les surfaces souillées par des projections ou aérosolisation de sang ou tout autre produit d'origine humaine





### I 3) Dans une chambre, un patient/résident a présenté des problèmes hémorragiques

*(plusieurs réponses possibles)*

- ☐ Vous éliminez les draps du lit souillés par du sang suivant le circuit habituel du linge sale de l'établissement
- ☐ Vous effectuez le Bionettoyage de cette chambre selon la procédure habituelle
- ☐ Vous transportez les échantillons biologiques dans un emballage étanche et fermé



## Réponses :

- Vous éliminez les draps du lit souillés par du sang suivant le circuit habituel du linge sale de l'établissement
- Vous effectuez le Bionettoyage de cette chambre selon la procédure habituelle
- Vous transportez les échantillons biologiques dans un emballage étanche et fermé



I 4) En consultation ou au bloc opératoire, le matériel (type dispositif médical) souillé par du sang ou tout autre produit d'origine humaine :

- ☐ Doit être obligatoirement transporté dans un bac de trempage
- ☐ Doit être déposé sur un chariot de soins et évacué secondairement en salle de pré désinfection
- ☐ Doit faire l'objet d'un signalement au correspondant de vigilance



Réponse :

**Doit être obligatoirement transporté dans un bac de trempage**



## RAPPEL DE LA PRÉCAUTION STANDARD

### Transport de prélèvements biologiques, linges et matériels souillés

- Les prélèvements biologiques, le linge et le matériel souillés par du sang ou tout autre produit d'origine humaine doivent être transportés dans un emballage étanche et fermé